

### ROŚLINY WIELOLETNIE UPRAWIANE JAKO JEDNOROCZNE I WYMAGAJĄCE PRZECHOWYWANIA ZIMĄ POD OSŁONAMI

asteriskus  
bakopa  
begonia bulwiasta  
bieluń  
chryzantema drzewiasta  
dipladenia 'Sandaville'  
fuksja mieszańcowa

gnafalium, kocanki włochate  
heliotrop peruwiański  
irezyna Herbsta  
koleus Blumego  
lantana pospolita  
pelargonja bluszczolistna  
plektrantus koleusowaty

scewola  
wilczomlec 'Diamond Frost'  
werbena (odmiany wiszące do pojemników)  
zielistka Sternberga

### GATUNKI PNĄCE I WIJĄCE SIĘ

dipladenia  
fasola wielkokwiatowa  
groszek pachnący

kobea pnąca  
nasturcja włóczęga  
rodochiton

tunbergia oskrzydłona  
wilec purpurowy

### PACHNĄCE GATUNKI JEDNOROCZNE I CEBULOWE

bazylia pospolita  
bieluń  
dziwaczek Jalapa  
groszek pachnący  
heliotrop krzewiasty  
hiacynth wschodni

konwalia majowa  
lantana  
lewkonia  
lilia  
narcyz  
ogórecznik

plektrantus koleusowaty  
pustynnik  
smagliczka nadmorska  
tulipan  
tytoń (Sandera, oskrzydłony)



Bratki i kocanki włochate posadzone w starym kamiennym pojemniku dopełniają się kolorystycznie.



## Objaśnienia symboli



ozdobne  
liście



wysiew nasion  
do gruntu



ozdobne  
kwiaty



cebule do  
wykopania



cebule zimujące  
w gruncie



sadzenie  
rozsady

# Katalog



## Agapant

*Agapanthus*

Rodzina: agapantowate (*Agapanthaceae*)

**WYSOKOŚĆ:** 50-90 cm.

**KWITNIENIE:** VII-IX.

**KWIATY:** Białe lub niebieskie, zebrane w główkowane grona na wysokich szypułkach.

**ORGANY PODZIEMNE:** Grube kłącze z mięsistymi korzeniami. Może wymarzać. Zagony należy okryć na zimę ściółką lub kłącza wykopać i przechować w temp. 2-5°C przykryte torfem lub trocinami.

**TERMIN SADZENIA:** Wiosną po podziale kłączy (koniec IV-V).

**ROZMNAŻANIE:** Podział dużych kłączy.

**STANOWISKO:** Zaciszne, słoneczne, gleba żyzna, wilgotna, ale nie podmokła. Należy obficie podlewać i nawozić.

**CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:** Roślina efektowna w dużych jednorodnych grupach lub w pojemnikach.



## Begonia bulwiasta

*Begonia x tuberhybrida*

Rodzina: ukośnicowate (*Begoniaceae*)

**WYSOKOŚĆ:** 25-35 cm, są też odmiany wiszące.

**KWITNIENIE:** V-X.

**KWIATY:** Różnobarwne, różnej wielkości, brzegi gładkie lub fryzowane.

**ORGANY PODZIEMNE:** Duża spłaszczona bulwa pokryta skórą. Należy je wykopywać i przechowywać w temp. 8-10°C.

**TERMIN SADZENIA:** III-IV do doniczek, po przymrozkach do gruntu lub pojemników.

**ROZMNAŻANIE:** Przez podział wiosną, II-III podział dużych kłączy lub siew nasion.

**STANOWISKO:** Półcieniste, zaciszne i wilgotne. Doskonała roślina do pojemników, a odmiany wiszące – do skrzynek balkonowych o wystawie północnej.

**CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:** Roślina wyjątkowo wartościowa i popularna dzięki długiemu kwitnieniu.



## Błonzatka, ismena

*Hymenocallis*

Rodzina: amarylkowate (*Amarylidaceae*)

**WYSOKOŚĆ:** 35-40 cm.

**KWITNIENIE:** VII-VIII.

**KWIATY:** Białe, z oryginalnie powyginanymi wąskimi płatkami i dużym przykoronkiem, pachnące.


**ORGANY PODZIEMNE:** Duża cebula osłonięta suchą łuską.

Wymaga wykopywania i przechowywania w temp. 12-15°C pod przykryciem z torfu lub trocin.

**TERMIN SADZENIA:** IV-V.

**ROZMNAŻANIE:** Oddzielanie cebul przybyszowych.

**STANOWISKO:** Słoneczne, zaciszne, gleba żyzna, wilgotna. Może być uprawiana w pojemnikach.



## Cantedeskia kolorowa

*Zantedeschia*, mieszańce *Z. ellottiana*,  
*Z. rehmanii*

Rodzina: obrazkowate (*Araceae*)

**WYSOKOŚĆ:** 60-100 cm.

**KWITNIENIE:** VII-VIII.

**POCHWY KWIATOSTANOWE:** Na wzniesionych szypułach, kielichowate, duże, różnobarwne.

**ORGANY PODZIEMNE:** Kuliste, spłaszczone kłącze. Wymagają wykopywania i przechowywania w temp. 9-12°C.

**TERMIN SADZENIA:** IV-V.

**ROZMNAŻANIE:** Oddzielanie fragmentów kłącza przed sadzeniem.

**STANOWISKO:** W półcieniu, na żyznej, wilgotnej, dobrze zdrenowanej glebie. Komponuje się w dużych grupach na tle ciemnozielonych krzewów.

**CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:** Dekoracyjne, nakrapiane liście.



## Cebulica Tubergena

*Scilla mischtsenkoana*, syn. *S. tubergeniana*

Rodzina: hiacyntowate (*Hyacinthaceae*)

**WYSOKOŚĆ:** 10-15 cm.

**KWITNIENIE:** III.

**KWIATY:** Biało-niebieskie, dzwonkowate.

**ORGANY PODZIEMNE:** Cebula ostonięta suchą łuską, zimotrwała.

**TERMIN SADZENIA:** IX – pocz. X.

**ROZMNAŻANIE:** Oddzielanie cebul przybyszowych.

**STANOWISKO:** Ma niewielkie wymagania. Najlepiej rośnie w pełnym słońcu na lekkiej glebie. Dobrze się prezentuje na skraju rabat, w pobliżu krzewów lub wokół niewielkich drzew. W sprzyjającym miejscu, np. na trawniku z rzadką trawą, tworzy efektowne kobierce.

**GATUNKI:** Cebulica syberyjska (*S. sibirica*) – kwiaty szafirowo-niebieskie.



## Czosnek olbrzymi

*Allium giganteum*

Rodzina: czosnkowate (*Alliaceae*)

**WYSOKOŚĆ:** 40-70 cm.

**KWITNIENIE:** V-VI.

**KWIATY:** Duże, dekoracyjne kuliste kwiatostany na długich szypułkach. Pojedyncze kwiaty gwiazdkowate: białe, lila, niebieskie, purpurowe, fioletowe, żółte. Stosowane czasem na kwiaty cięte. Długo stoją w wazonie.

**ORGANY PODZIEMNE:** Cebula ostonięta suchą łuską, zimotrwała.

**TERMIN SADZENIA:** IX – pocz. X.

**ROZMNAŻANIE:** Oddzielanie cebul przybyszowych lub siew nasion po ich dojrzeniu.

**STANOWISKO:** W pełnym słońcu na cieplej, przepuszczalnej glebie. Niskie gatunki i odmiany efektownie wyglądają sadzone grupami na skalniakach, średnie na wielogatunkowych rabatach, a najwyższe są idealne jako solitery.

**GATUNKI:** Niskie do 30 cm: czosnek karatawski (*A. karataviense*), czosnek neapolitański (*A. neapolitanum*), czosnek złocisty (*A. moly*); wysokie, 40-70 cm: czosnek Krzysztofa (*A. christophii*), *A. caeruleum*, czosnek główkowaty (*A. sphaerocephalon*), czosnek Szuberta (*A. schubertii*).



## Czosnek sztyletowaty

*Nectarosicordium sicculum*

Rodzina: czosnkowate (*Alliaceae*)

**WYSOKOŚĆ:** 40-60 cm.

**KWITNIENIE:** V-VI.

**KWIATY:** Dzwonkowate, zielonkawo-purpurowe, zebrane w luźne kwiatostany; wydzielają słodki nektar.

**ORGANY PODZIEMNE:** Cebula osłonięta suchą łuską, zimotrwała.

**TERMIN SADZENIA:** IX – pocz. X.

**ROZMNAŻANIE:** Oddzielanie cebul przybyszowych, siew nasion po ich dojrzewaniu.

**STANOWISKO:** W pełnym słońcu na cieplej, przepuszczalnej glebie.

**CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:** Efektowne na wielogatunkowych rabatach.



## Dalia

*Dahlia*

Rodzina: astrowate (*Asteraceae*)

**WYSOKOŚĆ:** Od 30 cm (odmiany karłowe) do 120 cm.

**KWITNIENIE:** VII-IX.

**KWIATY:** Różnobarwne, różniące się budową (pojedyncze, półpełne, peoniowe, pomponowe, kaktusowe itp.). Dalie pomponowe i kaktusowe nadają się na kwiaty cięte.

**ORGANY PODZIEMNE:** Karpy z licznymi bulwiastymi korzeniami. Wymagają wykopywania i przechowywania w temp. 5-10°C, lekko przykryte piaskiem.

**TERMIN SADZENIA:** Pocz. V do gruntu lub wcześniej do doniczek.


**ROZMNAŻANIE:** Przez podział karp IV-V.

**STANOWISKO:** Słoneczne, gleba żyzna. Na słabym stanowisku wymaga nawożenia i podlewania. Odmiany karłowe idealnie się nadają do pojemników i na obwódki, niskie – na kwietniki, rabaty, do skrzynek i mis, a średniowysokie i wysokie – do tworzenia grup ogrodowych, osłon, na wyższe partie rabat.

**CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:** Kruche pędy, szczególnie odmian wysokich, w czasie kwitnienia trzeba podwiązywać do palików.

C

D



## Galtonia biaława, hiacynt letni

*Galtonia candicans*

Rodzina: hiacyntowate (*Hyacinthaceae*)

**WYSOKOŚĆ:** 1-1,2 m.

**KWITNIENIE:** VII-VIII.

**KWIATY:** Duże, białe, dzwonkowate, osadzone na długim, okazałym pędzie.

**ORGANY PODZIEMNE:** Duża cebula osłonięta suchą łuską.

Wymaga wykopywania i przechowywania w temp. 12-15°C.

**TERMIN SADZENIA:** IV.

**ROZMNAŻANIE:** Oddzielanie cebul przybyszowych wczesną wiosną lub z nasion.

**STANOWISKO:** Słoneczne, gleba żyzna, wilgotna. Pięknie wygląda sadzona w dużych grupach na tle ciemnozielonych krzewów.



## Hiacyntik hiszpański, endymion, cebulica hiszpańska

*Hiacynthoides hispanica*

Rodzina: hiacyntowate (*Hyacinthaceae*)

**WYSOKOŚĆ:** 30-40 cm.

**KWITNIENIE:** V-VI.

**KWIATY:** Fioletowoniebieskie, niebieskie, białe, różowe, dzwonkowate, zebrane po osiem-dziesięć w kłosowate grona.

**ORGANY PODZIEMNE:** Cebula osłonięta suchą łuską, zimotrwała.

**TERMIN SADZENIA:** X-XI.

**ROZMNAŻANIE:** Oddzielanie cebul przybyszowych.

**STANOWISKO:** Słoneczne lub półcieniste, ciepłe, gleba przepuszczalna i zasobna. Dobrze wygląda na wielogatunkowych rabatach. Nadaje się na kwiaty cięte.